




# Strahlenschutzvorsorge in Nordrhein-Westfalen

Gemeinsamer Jahresbericht 2009  
der amtlichen Messstellen für Umweltradioaktivität



Zuständiges Ministerium:  
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  
Nordrhein-Westfalen (MKULNV)



## **Inhalt**

- 1. Grundlagen der Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG)**
- 2. Radiologische Grundlagen**
- 3. Messprogramme**
- 4. Integriertes Mess- und Informationssystem (IMIS )**
- 5. Ergebnisbericht 2009**
- 6. Glossar**

# 1. Grundlagen der Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG)

Infolge des Reaktorunfalls von Tschernobyl wurde 1986 das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG, BGBl. 1986 I S. 2610, zuletzt geändert 8.4.2008) erlassen, welches die Erfassung der **Radioaktivität** in unterschiedlichen Umweltbereichen regelt. Darüber hinaus ist die Bundesrepublik Deutschland nach dem EURATOM-Vertrag von 1957 verpflichtet, Einrichtungen zur ständigen Überwachung des Gehaltes der Luft, des Wassers und des Bodens an Radioaktivität sowie zur Überwachung der Einhaltung der Strahlenschutznormen zu schaffen.

Diese Rechtsgrundlage dient der Ermittlung der Exposition der Gesamtbevölkerung sowie dem vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenexposition durch radioaktive Stoffe vorwiegend künstlichen Ursprungs.

Man unterscheidet zwischen einem kontinuierlichen Routineprogramm und einem Intensivmessprogramm, welches bei einem Ereignis mit Freisetzung radioaktiver Stoffe in radiologisch nicht unerheblichem Umfang (z.B. bei Stör-/Unfällen kerntechnischer Anlagen oder beim Transport von radioaktiven Stoffen) ausgelöst wird.

## Radioaktivität

1. Potenzial von **Radionukliden**, sich unter Aussendung von  $\rightarrow$ ionisierender Strahlung ( $\rightarrow$ Alpha-, Beta-, Gammastrahlung) in stabilere umzuwandeln
2. Gehalt an radioaktiven Stoffen

## Radionuklide

Radioaktive Atomkerne

" $\rightarrow$ " bedeutet "siehe Glossar"

Zwischen den Einrichtungen des Bundes und denen der Länder besteht eine Aufgabenteilung, die sich an den Umweltbereichen orientiert.

In die Zuständigkeit des Bundes fallen die Ermittlung der Radioaktivität

- in Luft und Niederschlag,
- in den Bundeswasserstraßen,
- in Nord- und Ostsee einschließlich der Küstengewässer sowie die
- Messung der externen Strahlenbelastung in Form der Ortsdosisleistung.

Die Länder ermitteln die Radioaktivität in Bundesauftragsverwaltung in den Bereichen

- Lebensmittel,
- Futtermittel,
- Trinkwasser, Grundwasser und oberirdische Gewässer (außer Bundeswasserstraßen),
- Abwässer, Klärschlamm und Abfälle,
- Boden und
- Pflanzen (Indikatorpflanzen, die nicht der Ernährung dienen).

Darüber hinaus können die Länder interne Sonderprogramme zur Untersuchung spezieller Proben (z.B. Wildfleisch, Wildpilze) durchführen.

In Nordrhein-Westfalen ist für die fünf Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster jeweils eine Messstelle mit den Untersuchungen der genannten Umweltbereiche betraut, wobei bestimmte Untersuchungen aus Gründen der erforderlichen spezifischen Laborausstattung zentral erfolgen. Für die Entnahme der Lebensmittel- und Futtermittelproben auf Veranlassung der Messstellen sind die Ordnungsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Umweltproben werden von den Messstellen selbst entnommen.

Die von den Messeinrichtungen erhobenen Daten werden in einem bundesweiten DV-Netzwerk, dem Integrierten Mess- und Informationssystem (IMIS), erfasst und bereitgestellt. Sie sind Grundlage von Modellrechnungen und Prognosen. Daraus und aus der konkreten Belastungssituation können in einem radiologischen Ereignisfall Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor erhöhter Strahlenexposition abgeleitet werden.

Seit 1986 sind für Erzeugnisse aus Drittländern, die besonders von dem Unfall von Tschernobyl betroffen sind (Verordnung (EWG) Nr. 1707/86, ABl. Nr. L 152 vom 31.5.1986 ,bis zur Verordnung (EG) Nr. 733/2008, ABl. Nr. L 201 vom 15.7.2008) Höchstwerte für die **spezifische Aktivität** festgelegt.

Sie beziehen sich auf das langlebige Radiocäsium und betragen für Milch und Milcherzeugnisse sowie für Kleinkindernahrung 370 Bq/kg. Für alle anderen noch betroffenen Nahrungs- und Futtermittel 600 Bq/kg.

Da auf dem Gebiet der Europäischen Union noch heute Wildpilze, wild wachsende Beeren, Wildfleisch und Raubfische aus Seen höher belastet sein können, wurde den Ländern der Europäischen Union durch die EU-Kommission empfohlen (ABl. L 99 vom 17.4.2003), diese Höchstwerte auch bei dem Inverkehrbringen inländischer Produkte einzuhalten und die Bevölkerung über das Gesundheitsrisiko bei Verzehr solcher Produkte zu unterrichten.

Diese Empfehlung ist in Deutschland Grundlage dafür, höher belastete Erzeugnisse der o.g. Art nicht für die Vermarktung zuzulassen.

## 2. Radiologische Grundlagen

Materie besteht aus Atomen, die sich aus einem Atomkern und den ihn umhüllenden Elektronen zusammensetzen. Unter bestimmten Bedingungen können Atomkerne instabil (sog. Radionuklide) sein und in andere ebenfalls noch instabile oder stabile Kerne zerfallen. Dabei senden sie energiereiche Strahlung aus.

Die wichtigsten Strahlungsarten, die von Radionukliden ausgehen können, sind

- **Alphastrahlung**
- **Betastrahlung**
- **Gammastrahlung.**

Alle genannten Strahlungsarten übertragen auf bestrahlte Materie Energie und bewirken damit darin z.B. eine Abspaltung (man spricht daher auch von „ionisierender Strahlung“, denn es entstehen dabei elektrisch geladenen Ionen) oder Umlagerung von Elektronen, was in der Folge auch zu chemischen Veränderungen führt. Im biologischen Gewebe bewirken diese Veränderungen Schädigungen von Zellen oder Zellbestandteilen insbesondere der Erbgut tragenden DNS (Desoxyribonukleinsäure).

Das Durchdringungsvermögen dieser Strahlungsarten in Materie ist sehr unterschiedlich, was bei der Probenaufarbeitung bei der Wahl der Messtechnik (die Strahlung muss die Messproben ungehindert verlassen und den Detektor erreichen können) berücksichtigt werden muss (Abbildung 2.1)

### **Aktivität, spezifische**

Verhältnis der **Aktivität** eines Stoffes zur Masse des Stoffes, in dem der radioaktive Stoff verteilt ist (Einheit Bq/kg).

### **Aktivität**

Zahl der je Sekunde sich in einem radioaktiven Stoff umwandelnden Atomkerne. Die Maßeinheit ist das Becquerel (Bq). Früher übliche Einheit war das Curie (Ci).  
1 Ci = 37 Milliarden Bq

### **Alphastrahlung**

Strahlung radioaktiver Stoffe, die aus  $\rightarrow$ **Alphateilchen** besteht. Die Energie der Alphateilchen ist spezifisch für den Atomkern von dem sie stammen und kann zur Identifizierung des Radionuklids verwendet werden. Beispiele sind Uran und Thorium.

### **Alphateilchen**

Bei bestimmten radioaktiven Zerfällen ausgesandtes, positiv geladenes Teilchen. Es besteht aus zwei  $\rightarrow$ Neutronen und zwei  $\rightarrow$ Protonen.

### **Betastrahlung**

Strahlung von radioaktiven Stoffen, die aus  $\rightarrow$ **Betateilchen** besteht. Die Energie ist kontinuierlich bis zu einer Maximalenergie verteilt und ermöglicht nur eingeschränkt die Identifizierung des Radionuklids. Beispiele für reine Betastrahler sind Strontium-90 und Tritium.

### **Betateilchen**


$\rightarrow$ Elektron (negative Ladung) oder dessen Antiteilchen  $\rightarrow$ Positron (positive Ladung), das von einem Atomkern oder Elementarteilchen beim Betazerfall ausgesandt wird.

### **Gammastrahlung**

Strahlung von radioaktiven Stoffen, die aus  $\rightarrow$ **Gammaquanten** besteht. Sie wird von allen angeregten Atomkernen ausgesandt, die nach Umwandlung eines  $\rightarrow$ Radionuklids entstanden. Ihre Energie ist spezifisch für den Atomkern von dem sie stammen und kann zur Identifizierung des Radionuklids verwendet werden.

### **Gammaquant**

Energiequant kurzwelliger elektromagnetischer Strahlung (ähnlich Röntgenstrahlen), welches vom  $\rightarrow$ Atomkern beim Übergang von einem höher in einen niedriger angeregten Energiezustand ausgesandt wird.



**Abbildung 2.1: Abschirmung und Durchdringungsvermögen von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung**

Entscheidend für die biologische Wirkung, ist die vom Körper durch äußere Strahlung oder durch Strahlung inkorporierter radioaktiver Stoffe erhaltene **effektive Dosis**.

#### Dosis, effektive

Summe der gewichteten →**Organdosen** in den Geweben oder Organen des Körpers. Wichtungsfaktoren sind die Strahlenempfindlichkeit sowie die Speicherkapazität des Organs für den radioaktiven Stoff.

#### Organdosis

→**Äquivalentdosis** in einem Organ, Gewebe oder Körperteil. Bei Kombination mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die gesamte Organdosis die Summe der Einzelbeiträge durch äußere oder innere →Strahlenexposition

#### Äquivalentdosis

Produkt aus der →Energiedosis (absorbierte Dosis, Maßeinheit: Gray, Gy = Joule/kg) im Standard-Weichteilgewebe und einem →**Qualitätsfaktor**. Bei Kombination mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die Äquivalentdosis die Summe ihrer ermittelten Einzelbeiträge. Maßeinheit ist das Sievert (Sv)

#### Qualitätsfaktor

Wichtungsfaktor zur Ermittlung der →Äquivalentdosis, der die Einflüsse Strahlungsart und -energie (Strahlungsqualität) auf die biologische Wirksamkeit der Strahlung (→Strahlenwirkung) berücksichtigt. Für Gamma- und Betastrahlung hat der Qualitätsfaktor den Wert 1, für Alphastrahlung den Wert 20.

## Expositionspfade

Die Strahlenbelastung des Menschen beruht auf zwei Expositionspfaden:

- Die *äußere Strahlenexposition*, deren natürlicher Beitrag sich vorwiegend aus kosmischer und terrestrischer Strahlung zusammensetzt.
- Die *innere Strahlenexposition*, die infolge der Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Körper, z.B. durch die Atmung (Inhalation), oder durch Nahrungsaufnahme (Ingestion) erfolgt.

Bedingt durch das hohe Durchdringungsvermögen der Gammastrahlung wird die äußere Strahlenexposition fast ausschließlich von dieser Strahlungsart verursacht. Bei der Überwachung der Umgebungsstrahlung wird daher in der Regel nur die Gammadosis ermittelt. Sie wird mit geeigneten Messgeräten als Äquivalentdosis bestimmt.

Die innere Strahlenexposition wird überwiegend durch die Alpha- und Betastrahlung inkorporierter Radionuklide verursacht.

Da diese nicht direkt gemessen werden kann, wird sie mit Hilfe von Rechenmodellen ermittelt, ausgehend von gemessenen Aktivitäten in Luft, Boden, Nahrungsmitteln usw. Hierzu müssen alle Ausbreitungswege, An- und Abreicherungen in der Umwelt, durchschnittliche Verzehrsmengen und nuklid-spezifische Eigenschaften (**Dosisfaktoren**) berücksichtigt werden, die zur Strahlenexposition des Menschen beitragen (Abbildung 2.2).

#### Dosisfaktor

Wirksamkeitsfaktor eines radioaktiven Stoffes zur Ermittlung der →Strahlenexposition durch inkorporierte radioaktive Stoffe. Der Dosisfaktor ist abhängig vom →Radionuklid (→effektive Halbwertszeit, Strahlungsart, Zielorgan des Körpers), von der Inkorporationsart (Inhalation, Ingestion), von der chemischen Verbindung des Radionuklids (löslich, unlöslich), sowie vom Alter der Person (Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener)

#### Halbwertszeit, effektive

Zeit, in der in einem Organismus die Menge eines Stoffes im Zusammenwirken von → physikalischer und →biologischer Halbwertszeit auf die Hälfte abnimmt

$$T_{\text{eff}} = (T_{\text{phys}} \cdot T_{\text{biol}}) / (T_{\text{phys}} + T_{\text{biol}})$$

#### Halbwertszeit, physikalische

Zeit, in der die jeweils Hälfte der Radionuklide zerfällt

#### Halbwertszeit, biologische

Zeit, in der ein biologischer Organismus, beispielsweise Mensch oder Tier, auf natürlichem Wege die Hälfte der aufgenommenen Menge eines bestimmten Stoffes aus dem Körper oder einem speziellen Organ ausscheidet




Abbildung 2.2: Wege radioaktiver Stoffe aus Luft und Niederschlag zum Menschen

Abbildung 2.2 zeigt die vielfältigen Expositionspfade (z.B. Luft - Niederschlag - Futterpflanze - Kuh - Milch - Mensch), die bei den Dosisberechnungen berücksichtigt werden müssen. Im Hinblick auf die Herkunft der radioaktiven Stoffe unterscheidet man zwischen natürlicher und künstlicher oder zivilisatorischer Radioaktivität, wobei die biologische Wirkung in beiden Fällen gleich ist.

## Natürliche Radioaktivität

Einige Radionuklide z.B. Uran-238 ( $^{238}\text{U}$ ), Thorium-232 ( $^{232}\text{Th}$ ) und Kalium-40 ( $^{40}\text{K}$ ) sind aufgrund ihrer langen physikalischen Halbwertszeit (bei  $^{238}\text{U}$  beträgt diese 4,7 Milliarden, bei  $^{40}\text{K}$  1,3 Milliarden Jahre) seit der Entstehung der Erde noch in beträchtlicher Menge in der Erdkruste vorhanden (s. Abbildung 2.3).

Kalium-40 ist als biologisch essentielles Mengenelement in allen pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln enthalten (ca. 100 Bq/kg) und somit auch im Menschen selbst.

Die natürliche Strahlenbelastung über die Atemluft wird hauptsächlich durch das Edelgas Radon-222 ( $^{222}\text{Rn}$ ) und dessen Zerfallsprodukte, Radionuklide von Blei (Pb) und Polonium (Po) hervorgerufen. Es bildet sich in der Zerfallsreihe von Uran-238 über Radium-226 ( $^{226}\text{Ra}$ ) und geht vom Boden (z.T. durch Erdspalten) in die Atmosphäre über, von der aus die radioaktiven Folgeprodukte durch nasse (Niederschlag) oder trockene Deposition auf die Oberflächen von Boden und Pflanzen gelangen.

In der irdischen Atmosphäre wird natürliche Radioaktivität durch energiereiche Weltraumstrahlung gebildet. Hier entstehen durch Kernreaktionen von Neutronen (n) mit Stickstoff-Atomkernen ( $^{14}\text{N}$ ) die Radionuklide Kohlenstoff-14 ( $^{14}\text{C}$ ), Beryllium-7 und Tritium ( $^3\text{H}$ ).




Abbildung 2.3: Natürliche radioaktive Stoffe in Atmosphäre und Boden und deren physikalische Halbwertszeiten (y = Jahre, d = Tage, 10<sup>9</sup> = 1 Milliarde)

## Künstliche Radioaktivität


Künstliche Radionuklide werden z.B. in kerntechnischen Anlagen oder Beschleunigern erzeugt. Sie finden Verwendung in Medizin, Technik und Forschung.

Die künstliche Radioaktivität in der Umwelt entstammt Kernspaltungsprozessen und wurde bis 1986 von Rückständen der oberirdischen Kernwaffentests in den 50er und 60er Jahren, danach jedoch von den Auswirkungen des Unfalls im Kernkraftwerk von Tschernobyl dominiert.

Von besonderer Bedeutung für die Belastung des Menschen sind Radionuklide mit großer physikalischer Halbwertszeit z.B. Cäsium-137 (30 Jahre) oder Strontium-90 (28 Jahre) und mittlerer bis großer biologischer Halbwertszeit z.B. Cäsium (ca. 3 Monate bei Erwachsenen) und Strontium (ca. 50 Jahre).

## Effektive Jahresdosis

Durch die natürliche Strahlenexposition ergibt sich für die Bevölkerung in Deutschland eine mittlere effektive Jahresdosis von ca. 2,1 mSv (vgl. Parlamentsbericht "Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 2008", Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Postfach 120629, 53048 Bonn), die sich aus kosmischer und terrestrischer Strahlung sowie durch die Beiträge von Atmung und Nahrungsmittelverzehr zusammensetzt (s. Abbildung 2.4).



**Abbildung 2.4: Zusammensetzung der mittleren effektiven Jahresdosis durch natürliche Strahlenexposition**

Für die zivilisatorische Belastung durch ionisierende Strahlung ist der Einsatz von Röntgenstrahlen dominierend. Die Wirkung der Röntgenstrahlung ist der der Gammastrahlung ähnlich. Die zivilisatorische Strahlenexposition beträgt im Mittel etwa 1,9 mSv im Jahr. Nahezu 100% stammen dabei aus dem medizinischen Bereich.

Die mittlere Strahlenexposition durch den Reaktorunfall in Tschernobyl ist von 0,11 mSv/a im Unfalljahr 1986 auf heute weniger als 0,012 mSv im Jahr zurückgegangen.

Art der zivilisatorische Strahlenexposition	mittlere effektive Jahresdosis [mSv/a]
Kerntechnische Anlagen	< 0,01
Fallout von Kernwaffenversuchen	< 0,01
Reaktorunfall Tschernobyl	< 0,012
Anwendung in Forschung, Technik, Haushalt	< 0,01
Anwendung in der Medizin	ca. 1,9
<b>Summe:</b>	<b>ca. 1,9</b>

## Bestimmung der Radioaktivität in Proben nach dem StrVG

Nachdem Proben aufgearbeitet wurden, z.B. gewaschen, aufkonzentriert, getrocknet oder zu Asche verbrannt, werden die einzelnen radioaktiven Stoffe gemessen. Das Messverfahren richtet sich nach der Strahlenart der zu bestimmenden Radionuklide. In den meisten Fällen werden die Proben gammaspektrometrisch (Abbildung 2.5) untersucht, da

- viele strahlenbiologisch relevante Nuklide Gammastrahler sind.
- mit diesem Verfahren mehrere Nuklide gleichzeitig bestimmt werden können, weil jedes Nuklid bei der Kernumwandlung Gammastrahlen mit charakteristischen Energien (s. Abbildung 2.6) aussendet.
- die Aufarbeitung den geringsten Aufwand in Anspruch nimmt und das Analyseergebnis nach kurzer Zeit vorliegt.

### Gammastrahlung

Energieverteilung der →Gammaquanten eines →Radionuklids oder einer Mischung von Radionukliden, welche zu deren Identifizierung und Quantifizierung gemessen wird

Sowohl die benötigten Probenmengen wie auch die erforderlichen Messzeiten hängen wesentlich von dem Gehalt an Radioaktivität ab. Je geringer dieser ist, um so längere Messzeiten, größere Probenmengen bzw. aufwändigere Probenvorbereitungen sind erforderlich, um die spezifische Aktivität bzw. Aktivitätskonzentration hinreichend genau zu bestimmen.

Die Bestimmung alphastrahlender (z.B. Uran, Plutonium) oder ausschließlich betastrahlender Nuklide (z.B. Strontium-89, Strontium-90) ist wesentlich aufwändiger, da die betreffenden Elemente vor der Messung durch chemische Abtrennungen isoliert werden müssen.




Abbildung 2.5: Messplatz für Gammaskpektrometrie




Abbildung 2.6: Gammaskpektrum

### **3. Messprogramme**

Im Rahmen der Durchführung des StrVG werden folgende Messprogramme unterschieden:

- Messprogramm für den Normalbetrieb (Routinemessprogramm)
- Messprogramm für den Intensivbetrieb (Intensivmessprogramm)
- Sondermessprogramme

#### **Messprogramm für den Normalbetrieb (Routinemessprogramm)**

Das Routinemessprogramm dient der Gewinnung von Referenzwerten (Hintergrundwerten) für die Beurteilung von Ereignissen mit möglichen, nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen und der routinemäßigen Überwachung der Umweltradioaktivität.

Art und Anzahl sowie Zeitabstände und Orte der Probenahmen bzw. Messungen sind festgelegt.

Lebensmittel-, Futtermittel- und Umweltproben werden nach einem für jedes Bundesland festgelegten Mengengerüst an festgelegten Orten entnommen, um z.B. eine zeitliche Entwicklung der Umweltradioaktivität an einem bestimmten Ort verfolgen zu können.

In Nordrhein-Westfalen werden jährlich ca. 1800 Untersuchungen routinemäßig durchgeführt.

Hierbei werden 5 Untersuchungsarten unterschieden:

- Gammaskpektrometrie
- Alphaskpektrometrie
- Strontiumanalysen
- Tritiumanalysen
- In-situ-Messungen

Je nach Probenart und Untersuchungsziel sind festgelegte Nachweisgrenzen (bei der Gammaskpektrometrie beziehen sich diese auf das künstliche Radionuklid Cobalt-60) einzuhalten (Tabelle 3.1). Die in der Praxis erzielten Nachweisgrenzen können deutlich darunter liegen.

Bezeichnung	geforderte Nachweisgrenzen				
	Bq/kg Feuchtmasse bzw. Bq/l bzw. Bq/d*p (Gesamtnahrung)				Bq/m <sup>2</sup>
	Gammastrahlung 1)	Strontiumanalysen	Alphaspektrometrie	Tritiumanalysen	In-situ-Messungen 1)
Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft	0,2	0,04			
Nahrungsmittel tierischer Herkunft	0,2				
Gesamtnahrung	0,4	0,04			
Kindernahrung	0,2	0,02			
Milch und Milchprodukte	0,2	0,02			
Blätter, Tannennadeln, Gras 3)	0,5				
Futtermittel 4)	0,5	0,05 <sup>2)</sup>			
Boden 3)	0,5	0,5			200
Wasser	0,05	0,01	0,01	10	
Schwebstoffe 3)	5				
Sedimente 3)	5				
Trinkwasser	0,05	0,01	0,01	10	
Grundwasser	0,05	0,01	0,01	10	
Süßwasserfisch	0,2	0,02			
Abwasser	0,1	0,1	0,1		
Klärschlamm 3)	5	5	5		
Hausmülldeponie	0,1			10	
Verbrennungsanlagen	5				
Kompostierungsanlagen 3)	5				
Sonstige Produkte	0,2				

1) Nachweisgrenze bezogen auf Cobalt-60

2) nur Weidegras

3) Bezogen auf Trockenmasse

4) Bezogen auf Trockenmasse, Weidegras bezogen auf Feuchtmasse

**Tabelle 3.1: Probeneinteilung und geforderte Nachweisgrenzen**

In bundeseinheitlichen Messanleitungen (Normverfahren) werden die Arbeitsabläufe, angefangen bei der Probenahme über die Probenaufbereitung bis hin zur Messung festgelegt, um einen Vergleich der gewonnenen Messergebnisse zu ermöglichen.

Für die Durchführung dieser Aufgaben sind in Nordrhein-Westfalen 5 amtliche Messstellen zuständig, die jeweils einem Regierungsbezirk zugeordnet sind.

Diese Regionalisierung der Zuständigkeiten bietet mehrere fachliche, logistische und organisatorische Vorteile:

- Durch die Regionalisierung lassen sich örtliche Gegebenheiten bei den Probenahmen besser berücksichtigen
- Die von einer Messstelle unter regionalen Gesichtspunkten überwachten Umweltmedien lassen Rückschlüsse auf die Übergangsfaktoren von einem Medium zum anderen zu (z.B. Auswirkung der radioaktiven Belastung des Bodens auf den Bewuchs).
- Die Wege vom Ort der Probenahme zu den Messstellen sind kürzer als bei einem zentralisierten medienbezogenen Programm.
- Die Messaufgaben sind nahezu gleichmäßig auf die Messstellen verteilt, was organisatorische und haushaltstechnische Maßnahmen wesentlich vereinfacht.

Die in Nordrhein-Westfalen zuständigen 5 amtlichen Messstellen sind:

- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe, Münster
- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe, Detmold
- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Außenstelle Düsseldorf
- Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Betriebsstelle Eichamt Dortmund
- Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW, Düsseldorf

### **Messprogramm für den Intensivbetrieb (Intensivmessprogramm)**

Das Intensivmessprogramm dient der Erfassung der radioaktiven Kontamination von Lebens- und Futtermitteln sowie der Umwelt im Falle von Ereignissen mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen.

Auf Veranlassung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) wird der Intensivmessbetrieb im Ereignisfall oder zu Übungszwecken ausgelöst und beendet.

Der Intensivmessbetrieb (bei lokalem Ereignis auch sektoriert) kann z.B. durch folgende Ereignisse ausgelöst werden:

- Freisetzung radioaktiver Stoffe bei einem Unfall in einer in- oder ausländischen kerntechnischen Anlage mit der Möglichkeit eines Eintrages radioaktiver Stoffe im Bundesgebiet
- Freisetzung radioaktiver Stoffe bei Transportunfällen
- Absturz einer Raumsonde mit nuklearer Stromversorgung
- Freisetzung radioaktiver Stoffe aus einem nuklear angetriebenen Schiff nach einer Havarie
- Größere Nukleare Explosion

Im Intensivmessbetrieb wird die Anzahl der Proben sowie die lokale Dichte der Probenahme- und In-situ-Messorte erheblich gesteigert.

Für diesen Fall halten die Messstellen hinreichende personelle und apparative Ausstattungen vor.

Das Intensivmessprogramm wird in 3 Phasen aufgeteilt:

- Phase 1: vor und während der Ausbreitung radioaktiver Stoffe
- Phase 2: unmittelbar nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe
- Phase 3: nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe und nach Rückgang der hohen Anfangskontamination

Darüber ist hinaus vorgesehen, dass ab Phase 2 auch Lebensmittel- und Futtermittelproben aus der Handelsstufe zur Überwachung der Einhaltung von Grenzwerten untersucht werden.

### **Sondermessprogramme**

Neben dem Routinemessbetrieb können landeseigene Sondermessungen durchgeführt werden.

So werden in Nordrhein-Westfalen zusätzlich die zum Teil noch höher belasteten Wildpilze (z.B. der Maronen-Röhrling, s. Abbildung 3.1) und Wildfleisch untersucht.



**Abb 3.1: Maronen-Röhrling**

Im Routinemessprogramm werden, abgesehen von den Importproben, grundsätzlich nur Proben untersucht, die unmittelbar von Erzeugerbetrieb stammen. Um einen Überblick über die Radioaktivität in Lebens- und Futtermittel der Handelsstufe zu erhalten, werden in NRW zusätzlich Proben vom Handel untersucht, deren Herkunftsort im In- oder Ausland liegt.

## 4. Integriertes Mess- und Informationssystem (IMIS)

Das Integrierte Mess- und Informationssystem wurde in der Bundesrepublik nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl eingerichtet.

IMIS ist ein bundesweites Messsystem, an dem insgesamt 72 Rechnerstandorte bei Institutionen des Bundes und der Länder beteiligt sind. Rund um die Uhr speichert das System Daten von 5 Bundesmessnetzen mit über 1000 ortsfesten Messstationen und ca. 40 Landesmessstationen (Abbildung 4.1).

Die Messdaten werden nach einer ersten fachlichen Prüfung an die Zentralstelle des Bundes geleitet. Diese übermittelt die Daten zur abschließenden Plausibilitätsprüfung, Auswertung und Aufbereitung an die für die jeweiligen Umweltbereiche zuständigen fachlichen Einrichtungen des Bundes (Leitstellen).

Anschließend werden die Ergebnisse an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit weitergeleitet. Letzteres entscheidet gegebenenfalls über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Relevante Daten und Informationen werden der Öffentlichkeit regelmäßig zur Verfügung gestellt (Internetlink: <http://www.bfs.de>).




Abbildung 4.1: Datenfluss im IMIS

## 5. Ergebnisübersichten zur Überwachung der Umweltradioaktivität in Nordrhein-Westfalen 2009

### Zusammenfassung:

Die Überwachung der Umweltradioaktivität in Nordrhein-Westfalen wird durch die fünf amtlichen Messstellen des Landes auf der Grundlage der Messprogramme nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) sowie nach einem landeseigenen Messprogramm durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen des Jahres 2009 zeigen, dass die in Nordrhein-Westfalen erzeugten Lebens- und Futtermittel sowie Trinkwasser insgesamt nur äußerst geringe Gehalte künstlicher Radioaktivität aufweisen. In Böden, Pflanzen aus nicht landwirtschaftlich genutzten Bereichen (Blätter, Nadeln, Gras), Schwebstoffen und Sedimenten aus Gewässern, Feststoffproben von Abfällen sowie in Wildpilzen und Wildfleisch sind demgegenüber höhere Gehalte künstlicher radioaktiver Stoffe nachzuweisen.

### Weideboden, Ackerboden

Böden enthalten in erster Linie die natürlich vorkommenden Radionuklide aus den Zerfallsreihen des Urans und Thoriums sowie das Kalium-40 (K 40). Von den künstlich erzeugten Radionukliden werden heute noch unter Einhaltung der einzuhaltenden Nachweisgrenzen Cäsium-137 (Cs 137) gamma-spektrometrisch und Strontium-90 (Sr 90) radiochemisch nachgewiesen. Sie stammen zum größten Teil von dem Reaktorunfall in Tschernobyl und aus den atmosphärischen Kernwaffenversuchen. Entsprechend den zum Zeitpunkt des Reaktorunfalls (1986) herrschenden meteorologischen Bedingungen (Durchzug der radioaktiven Wolke, Dauer und Intensität des zeitgleichen Niederschlages) wurden die einzelnen Regionen in Nordrhein-Westfalen, unterschiedlich kontaminiert. Die Wanderung der Radionuklide Cäsium-137 und Strontium-90 in den Boden hinein erfolgt nur sehr langsam. Da beide Radionuklide eine lange Halbwertszeit aufweisen, verändert sich ihre spezifische Aktivität im Boden von Jahr zu Jahr nur geringfügig.

Probenart	Radionuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Weideböden	Cs 137	14	0	6,3	26	13	Bq/kg(TM)
	K 40	14	0	237	700	479	
	Sr 90	4	0	0,27	6,7	2,2	
Ackerböden	Cs 137	11	0	5,0	15	8,7	Bq/kg(TM)
	K 40	11	0	259	662	517	
	Sr 90	5	1	0,44	1,8	0,93	

Anmerkung:

NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
 TM = Trockenmasse

**Tabelle 5.1: Spezifische Cs-137, K-40 und Sr-90 Aktivitäten in Böden aus NRW 2009**

Je nach Bodenart bzw. -nutzung sind Unterschiede bezüglich des Gehalts künstlicher radioaktiver Stoffe festzustellen (Tabelle 5.1, Abbildung 5.1 und Abbildung 5.2). In Ackerböden, die mehrfach durchpflügt wurden, kann man von einer gleichmäßigen Verteilung der künstlichen Radionuklide bis zur Pflugtiefe (15 – 40 cm) ausgehen, was sich in einer kleineren Streuung der Messwerte bestätigt. Bei unbearbeiteten Böden (z.B. Weideböden) verhindert die Fixierung an Tonmineralien die Wanderung der Radionuklide in tiefere Schichten, weswegen bei der Probenahme eine Einstichtiefe von 10 cm ausreicht.




Abbildung 5.1: Spezifische Cs-137 Aktivität in verschiedenen Bodenarten NRW 2009




Abbildung 5.2: Spezifische Sr-90 Aktivität in verschiedenen Bodenarten NRW 2009

### Futtermittel und Pflanzen als Indikatoren

Futtermittel sind die Zwischenstation für den Transfer von Radionukliden vom Boden in tierische Nahrungsmittel und damit in den Menschen. Bei den sich ergebenden unterschiedlichen Aktivitätskonzentrationen in Futtermitteln spielen sowohl pflanzenphysiologische Faktoren als auch die Verfügbarkeit der Radionuklide im Boden (Bodenart) und die Bodenbearbeitung und -bewirtschaftung eine Rolle. So weisen Futtermittel, die auf unbearbeiteten Böden wachsen (Grünfutter), höhere Aktivitätskonzentra-

tionen auf als diejenigen Futtermittel, die auf bearbeiteten Böden wachsen ( Mais, Getreide, Kartoffeln, Rüben) (Tabelle 5.2; man beachte die unterschiedlichen Einheiten Bq/kg(FM) bzw. Bq/kg(TM)). Futtermittel werden flächenrepräsentativ überwacht. Neben einheimisch erzeugten werden auch importierte Futtermittel (Tabelle 5.3) und in einem landeseigenen Messprogramm Futtermittel aus der Handelsstufe überwacht (Tab 5.4).

Darüber hinaus werden weitere Pflanzenproben aus Bereichen ohne landwirtschaftliche Nutzung überwacht (Tabelle 5.5). Hierbei handelt es sich um Teile von Pflanzen, die überall zur Verfügung stehen und als Indikatoren geeignet sind ( Gras, Blätter, Nadeln ).

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Weide- u. Wiesenbewuchs	Cs 137	20	15	0,050	0,91	0,35	Bq/kg(FM)
	K 40	20	0	49	317	200	
	Sr 90	10	0	0,21	2,0	0,51	
Grünfütterpflanzen (außer Weide- u. Wiesenbewuchs)	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	1	0	802	-	-	
Mais (ganze Pflanze)	Cs 137	28	28	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	28	0	123	593	300	
	Sr 90	1	0	0,16	-	-	
Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	Cs 137	18	18	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	18	0	44	188	135	
	Sr 90	1	0	0,13	-	-	
Futterkartoffeln und Futterrüben	Cs 137	10	10	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	10	0	224	940	681	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
 FM = Feuchtmasse  
 TM = Trockenmasse

**Tabelle 5.2: Spezifische Cs-137, K-40 und Sr-90 Aktivitäten in Futtermitteln aus NRW 2009**

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	Cs 137	4	3	0,29	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	4	0	124	870	408	
Sonstige Futtermittel	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	1	0	773	-	-	
Schrote	Cs 137	3	3	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	3	0	579	816	702	
Kraffuttermischungen	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	1	0	420	-	-	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
 TM = Trockenmasse

**Tabelle 5.3: Spezifische Cs-137 und K-40 Aktivitäten in importierten Futtermitteln 2009**

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	Cs 137	5	5	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	5	0	106	143	124	
Futterkartoffeln und Futterrüben	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	1	0	635	-	-	
Heu	Cs 137	1	0	30	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	1	0	419	-	-	
Sonstige Futtermittel	Cs 137	2	1	1,9	-	-	Bq/kg(TM)
	K 40	2	0	732	790	761	
Kraftfuttermischungen	Cs 137	5	3	0,14	0,44	0,29	Bq/kg(TM)
	K 40	5	0	230	361	276	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
 TM = Trockenmasse

**Tabelle 5.4: Spezifische Cs-137 und K-40 Aktivitäten in Futtermitteln aus der Handelsstufe 2009**

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Blätter	Cs 137	9	5	1,0	15	5,9	Bq/kg(TM)
	K 40	9	0	261	790	389	
Nadeln	Cs 137	4	1	0,61	70	24	Bq/kg(TM)
	K 40	4	1	143	384	217	
Gras	Cs 137	10	5	0,40	1,5	0,93	Bq/kg(TM)
	K 40	10	0	530	1540	952	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
 TM = Trockenmasse

**Tabelle 5.5: Spezifische Cs-137 und K-40 Aktivitäten in Indikatorpflanzen aus NRW 2009**

## Lebensmittel

Der überwiegende Teil der Überwachung der Radioaktivität in Lebensmitteln erstreckt sich auf Produkte, die in Nordrhein-Westfalen erzeugt werden (786 Proben). 96 Lebensmittelproben stammten aus dem Import und in einem landeseigenen Messprogramm wurden 272 Lebensmittelproben aus der Handelsstufe überwacht. Die Entnahme von einheimischen Lebensmitteln erfolgt direkt beim Erzeuger. Anzahl und Art dieser Proben sind in Tabelle 5.6 dargestellt.

Probenart	Anzahl der Proben im Jahr 2009
Gemüse	209
Getreide	50
Obst	29
Kartoffeln	19
Schweinefleisch	95
Geflügelfleisch	39
Rindfleisch	53
Kalbfleisch	17
Rohmilch	96
Gesamtnahrung	128
Säuglings- und Kleinkindnahrung	24
Süßwasserfisch	27

**Tabelle 5.6: Art und Anzahl von Erzeugerproben NRW**

Die Lebensmittel pflanzlicher Herkunft vom Freiland werden regional und über das Jahr verteilt erntereif entnommen und untersucht. Lebensmittel tierischer Herkunft werden gleichmäßig über das Jahr verteilt untersucht. Die Messung von Rohmilchproben erfolgt monatlich. Gesamtnahrung (Frühstück, Mittag- und Abendessen für eine Person aus einer Gemeinschaftsverpflegung) wird stichprobenartig wöchentlich entnommen und als 2-Wochen Mischprobe gemessen. Säuglings- und Kleinkindernahrung (Menüs und Getränke) einschließlich Milchersatznahrung werden monatlich entnommen und gemessen. Süßwasserfisch wird sowohl aus Fließgewässern (Rhein, Wupper, Lippe, Sieg) wie auch aus der Teichwirtschaft entnommen und gemessen. Alle Lebensmittelproben werden gammaspektrometrisch untersucht. Ein Anteil zwischen 10 % und 30 %, abhängig von der Probenart, wird zusätzlich auf den Gehalt an Strontium-90 analysiert. Bei den meisten der in Tabelle 5.7 aufgelisteten Lebensmittelproben liegt die spezifische Cäsium-137 Aktivität unterhalb der Nachweisgrenze für dieses Messverfahren. Messbare spezifische Aktivitäten der künstlichen Radionuklide Strontium-90 und Cäsium-137 liegen mit ihren Mittelwerten unter 5 Bq/kg(FM) bzw. Bq/l bzw. Bq/(d\*p).

Ähnlich verhält es sich bei importierten Lebensmitteln und bei Lebensmitteln aus der Handelsstufe (Tabelle 5.8 und Tabelle 5.9).

Probenart	Radionuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinstes Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Sammelmilch (Kuh-)	Cs 137	95	87	0,12	0,87	0,28	Bq/l
	K 40	95	0	39	68	52	
	Sr 90	11	0	0,020	0,069	0,038	
Hofmilch (Kuh-)	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/l
	K 40	1	0	51		-	
Blattgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	103	99	0,26	0,63	0,39	Bq/kg(FM)
	K 40	103	0	47	299	115	
	Sr 90	5	0	0,060	0,14	0,094	
Wurzelgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	34	34	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	34	0	20	171	116	
	Sr 90	3	0	0,043	0,18	0,13	
Fruchtgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	35	35	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	35	0	48	205	97	
	Sr 90	1	1	-	-	-	
Sprossgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	37	36	0,21		-	Bq/kg(FM)
	K 40	37	0	43	155	94	
	Sr 90	3	0	0,020	0,33	0,14	
Kartoffeln	Cs 137	19	19	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	19	0	99	166	136	
	Sr 90	5	1	0,0042	0,11	0,043	
Getreidekörner (Weizen-, Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalekörner)	Cs 137	49	47	0,062	0,19	0,12	Bq/kg(FM)
	K 40	49	0	101	510	143	
	Sr 90	4	0	0,028	0,23	0,10	
Sonstige Getreidearten	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	125		-	
Kernobst	Cs 137	14	14	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	14	0	27	66	44	
	Sr 90	4	1	0,017	0,060	0,032	
Steinobst	Cs 137	3	3	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	70	185	111	
Beerenobst, ungeschützter Anbau (außer Wald-/Wildbeeren)	Cs 137	8	8	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	8	0	46	86	63	
Wald-/Wildbeeren	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	35		-	
Sonstige Obstarten	Cs 137	3	3	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	119	147	130	
Rindfleisch	Cs 137	53	40	0,13	4,8	0,62	Bq/kg(FM)
	K 40	53	0	77	131	107	
Kalbfleisch	Cs 137	17	7	0,13	1,2	0,46	Bq/kg(FM)
	K 40	17	0	73	130	96	
Schweinefleisch	Cs 137	95	88	0,093	0,47	0,17	Bq/kg(FM)
	K 40	95	0	12	173	107	
Geflügelfleisch	Cs 137	39	38	0,233		-	Bq/kg(FM)
	K 40	39	0	79	175	108	
Süßwasserfisch	Cs 137	27	13	0,15	0,51	0,27	Bq/kg(FM)
	K 40	27	0	103	171	127	
	Sr 90	3	2	0,0059		-	
Gesamtnahrung	Cs 137	128	124	0,080	0,58	0,38	Bq/(d*p)
	K 40	128	0	16	213	112	
	Sr 90	20	2	0,0055	0,58	0,13	
Säuglings- und Kleinkindernahrung	Cs 137	24	24	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	24	0	22	69	41	
	Sr 90	4	2	0,050	0,050	0,050	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze, FM = Feuchtmasse, Bq/(d\*p) = Aktivität pro Tageskost

**Tabelle 5.7: Spezifische Cs-137 und K-40 Aktivitäten in Lebensmitteln aus NRW 2009**

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinsten Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Blattgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	4	4	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	4	0	79	220	133	
Wurzelgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	102		-	
Fruchtgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	13	13	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	13	0	42	97	76	
Sprossgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	4	4	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	4	0	57	130	94	
Kartoffeln	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	179		-	
Kernobst	Cs 137	2	2	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	2	0	34	37	36	
Steinobst	Cs 137	2	2	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	2	0	55	56	56	
Beerenobst, ungeschützter Anbau (außer Wald-/Wildbeeren)	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	46		-	
Sonstige Obstarten	Cs 137	4	4	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	4	0	60	131	96	
Rindfleisch	Cs 137	7	6	3,76		-	Bq/kg(FM)
	K 40	7	0	118	147	127	
Kalbfleisch	Cs 137	3	0	0,36	0,81	0,57	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	76	107	96	
Schweinefleisch	Cs 137	3	3	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	87	116	99	
Geflügelfleisch	Cs 137	7	6	0,22		-	Bq/kg(FM)
	K 40	7	0	88	121	100	
Lammfleisch	Cs 137	2	1	0,34		-	Bq/kg(FM)
	K 40	2	0	120	126	123	
Süßwasserfisch	Cs 137	18	14	0,14	3,7	1,4	Bq/kg(FM)
	K 40	18	0	62	139	99	
Seefisch	Cs 137	10	5	0,23	7,0	2,2	Bq/kg(FM)
	K 40	10	0	87	140	120	
Käse aus Kuhmilch	Cs 137	11	10	3,0		-	Bq/kg(FM)
	K 40	11	0	20	51	27	
Käse aus Milch anderer Tiere	Cs 137	3	2	0,36		-	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	2,4	26	15	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
FM = Feuchtmasse

**Tabelle 5.8: Spezifische Cs-137 und K-40 Aktivitäten in importierten Lebensmitteln 2009**

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
bearbeitete Trinkmilch (Kuh-)	Cs 137	17	16	0,23		-	Bq/l
	K 40	17	0	46	66	56	
Blattgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	26	26	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	26	0	35	277	120	
Wurzelgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	10	10	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	10	0	54	132	96	
Fruchtgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	29	29	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	29	0	32	115	80	
Sprossgemüse, ungeschützter Anbau	Cs 137	10	10	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	10	0	41	149	112	
Kartoffeln	Cs 137	11	11	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	11	0	110	155	129	
Kulturpilze	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	145		-	
Getreidekörner (Weizen-, Roggen-, Gersten-, Hafer-, Mais-, Triticalekörner)	Cs 137	11	10	0,08		-	Bq/kg(FM)
	K 40	11	0	118	200	139	
Sonstige Getreidearten	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	154		-	
Kernobst	Cs 137	13	13	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	13	0	22	56	38	
Steinobst	Cs 137	9	9	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	9	0	46	88	73	
Beerenobst, ungeschützter Anbau (außer Wald-/Wildbeeren)	Cs 137	2	2	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	2	0	52	58	55	
Sonstige Obstarten	Cs 137	12	12	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	12	0	40	149	74	
Rindfleisch	Cs 137	19	13	0,18	8,0	2,1	Bq/kg(FM)
	K 40	19	0	93	131	112	
Kalbfleisch	Cs 137	4	1	0,35	1,0	0,58	Bq/kg(FM)
	K 40	4	0	82	106	98	
Schweinefleisch	Cs 137	21	20	0,08		-	Bq/kg(FM)
	K 40	21	0	81	163	112	
Geflügelfleisch	Cs 137	13	11	0,045	0,38	0,21	Bq/kg(FM)
	K 40	13	0	86	146	115	
Lammfleisch	Cs 137	8	7	0,20		-	Bq/kg(FM)
	K 40	8	0	65	145	107	
Käse aus Kuhmilch	Cs 137	18	17	0,39		-	Bq/kg(FM)
	K 40	18	0	10	65	27	
Käse aus Milch anderer Tiere	Cs 137	6	6	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	6	0	11	28	18	
Milchprodukte außer Käse, Frischprodukte	Cs 137	25	24	0,10		-	Bq/kg(FM)
	K 40	25	0	17	82	52	
Gemüseprodukte einschl. Kartoffeln, Frischprodukte auch tiefgefroren	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	315		-	
Getreideprodukte außer Brot	Cs 137	3	1	0,16	1,1	0,65	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	95	128	112	
Fleischprodukte u. Wurstwaren, ohne Wild, Frischprod. auch tiefgefz.	Cs 137	2	2	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	2	0	72	102	87	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
FM = Feuchtmasse

Tabelle 5.9: Spezifische Cs-137 und K-40 Aktivitäten in Lebensmitteln der Handelsstufe 2009

In Tabelle 5.10 und den Abbildung 5.3 u. 5.4 sind Zeitreihen der Aktivitätskonzentrationen für Cäsium-137 in Erzeugerproben aus Nordrhein-Westfalen dargestellt. Aus ihnen ist ersichtlich, dass die spezifische Aktivität von Cäsium-137 ( Minimal-, Maximal- und Mittelwerte ) in Erzeugerproben seit dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 deutlich zurückgegangen ist. Die Größenachse in den Zeitreihen ist, der besseren Darstellung wegen, logarithmisch aufgeteilt.

Proben	Jahr	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	% Anteil Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Dimension
Milch	1986	7	-	0,0%	1,7	382	75,7	Bq / l
	1987	8	-	0,0%	2	13	4,8	
	1988	3	-	0,0%	1	4,5	2,6	
	1989	8	-	0,0%	0,36	2,4	1,2	
	1990	20	1	5,0%	0,06	1,6	0,69	
	1991	115	58	50,4%	0,03	3,3	0,29	
	1992	128	75	58,6%	0,04	1,1	0,20	
	1993	135	94	69,6%	0,03	1,3	0,19	
	1994	106	77	72,6%	0,02	1,4	0,14	
	1995	105	80	76,2%	0,02	1,1	0,18	
	1996	99	69	69,7%	0,01	2,0	0,19	
	1997	124	95	76,6%	0,01	1,1	0,16	
	1998	122	95	77,9%	0,04	0,64	0,14	
	1999	123	105	85,4%	0,04	0,76	0,15	
	2000	120	97	80,8%	0,04	0,69	0,15	
	2001	110	100	90,9%	0,05	0,56	0,14	
	2002	121	108	89,3%	0,1	0,38	0,22	
	2003	121	111	91,7%	0,1	0,40	0,20	
	2004	123	102	82,9%	0,1	0,40	0,20	
	2005	116	103	88,8%	0,1	0,96	0,22	
2006	114	98	86,0%	0,1	0,32	0,16		
2007	99	89	89,9%	0,1	0,34	0,20		
2008	94	88	93,6%	0,1	0,68	0,30		
2009	96	88	91,7%	0,1	0,87	0,28		
Rindfleisch	1986	12	2	16,7%	4	160	42,2	Bq / kg(FM)
	1987	18	2	11,1%	1	140	27,4	
	1988	20	3	15,0%	1	99,7	15,4	
	1989	22	3	13,6%	0,17	42,6	6,7	
	1990	23	2	8,7%	0,07	27,9	2,3	
	1991	70	28	40,0%	0,03	3	0,42	
	1992	69	36	52,2%	0,03	21	1,2	
	1993	64	36	56,3%	0,03	7,3	0,56	
	1994	48	32	66,7%	0,003	1,7	0,31	
	1995	48	21	43,8%	0,04	6,5	0,53	
	1996	47	20	42,6%	0,02	50,7	1,7	
	1997	58	33	56,9%	0,03	25,6	0,66	
	1998	44	32	72,7%	0,07	0,97	0,21	
	1999	58	36	62,1%	0,07	2,5	0,4	
	2000	55	34	61,8%	0,08	2,8	0,33	
	2001	38	28	73,7%	0,09	2,9	0,35	
	2002	37	30	81,1%	0,08	0,6	0,28	
	2003	37	18	48,6%	0,10	3,7	0,60	
	2004	39	18	46,2%	0,10	2,0	0,50	
	2005	36	25	69,4%	0,11	1,2	0,49	
2006	37	27	73,0%	0,08	2,7	0,65		
2007	52	35	67,3%	0,12	3,6	0,57		
2008	53	34	64,2%	0,12	3,6	0,57		
2009	53	40	75,5%	0,13	4,8	0,62		

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
 FM = Feuchtmasse

**Tabelle 5.10: Spezifische Cs-137 Aktivität in Erzeugerproben NRW 1986 - 2009**




Abbildung 5.3: Spezifische Cs-137 Aktivität in Milch NRW 1986 - 2009




Abbildung 5.4: Spezifische Cs-137 Aktivität in Rindfleisch NRW 1986 - 2009

## Wildpilze und Wildfleisch

Diese beiden Lebensmittelgruppen können derzeit noch höher mit Radiocäsium belastet sein. Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen spielt Cäsium-137 durch Bearbeitungs- und Düngemaßnahmen als Kontaminant kaum noch eine Rolle, da es dort fest an Bodenbestandteile gebunden wird und den Wurzeln praktisch nicht zur Verfügung steht. Damit ist es auch in den landwirtschaftlich erzeugten pflanzlichen und tierischen Lebens- und Futtermitteln nahezu bedeutungslos geworden.

In Waldökosystemen hingegen bildet sich, aufgrund des dort herrschenden Kaliummangels und der sauren Böden ein Kreislauf des Radiocäsiums aus, der in der Zersetzungszone im Waldboden, der Humusschicht (in ca. 5-7 cm Tiefe) zu einer Anhäufung des Radiocäsiums führt, und darüber hinaus für Flachwurzeln und das Pilzmyzel dort leicht verfügbar ist. Das Cäsium-137 wird also solange im Kreislauf verbleiben, bis es zu einem vernachlässigbaren Rest zerfallen ist.

Die regional sehr unterschiedliche Cäsium-137-Kontamination der Waldpflanzen führt zwangsläufig zu einer ebenfalls regional sehr unterschiedlichen Belastung des Wildbrets. Im Herbst, in der Mästphase für den Winter, in der die Tiere auch verstärkt Pilze aufnehmen, ist die spezifische Aktivität am höchsten. Generell gilt, dass Schwarzwild bezüglich der Radiocäsiumkontamination heute die als kritisch einzustufende Tierart ist. Dies kommt u.a. daher, dass Wildschweine ihre Nahrung (z.B. in Form des hochbelasteten Hirschtrüffels) vermehrt in der Humusschicht suchen.

Wildwachsende Pilze entnehmen ihre Nährstoffe ebenfalls aus der Humusschicht, so dass es auch bei diesen zu einer verstärkten Anreicherung des Radiocäsiums kommen kann. Es hat sich gezeigt, dass hier neben der örtlichen Bodenkontamination sortenspezifische Eigenschaften starken Einfluss auf die Höhe der Belastung haben.

Im Frühjahr bzw. Herbst werden Sondermessungen an den beiden Lebensmittelgruppen Wildfleisch und essbare wildwachsende Pilze durchgeführt, deren Ergebnisse in den Tabelle 5.12 und 5.13 sowie in der Abbildung 5.5 dargestellt sind.

In Europa ist es nicht erlaubt, Lebensmittel in den Verkehr zu bringen, wenn der Höchstwert für Radiocäsium von 600 Bq/kg (370 Bq/kg bei Milch und Milcherzeugnisse sowie bei Kleinkindernahrung) überschritten wird. Dieser nach EG-Verordnung 733/2008/EG für Importware geltende Höchstwert wird auch auf Inlandprodukte sinngemäß angewendet. Da in den letzten Jahren in der Senne und angrenzenden Gebieten vermehrt Wildschweine mit erhöhten Radiocäsiumgehalten beobachtet wurden, werden seither alle im Zeitraum Januar bis Mai erlegten Wildschweine aus diesem Gebiet auf radioaktive Belastung untersucht. Im Berichtsjahr 2009 wurden 7 Proben festgestellt, deren Werte signifikant (d.h. abzüglich der zweifachen Standardabweichung als erweiterte Messunsicherheit) oberhalb des o.g. Grenzwertes lagen. Die Ergebnisse der 7 Grenzwertüberschreitungen sind in Tabelle 5.11 dargestellt.

Probenart	Probenahmebeginn	Radionuklid	Messwert	Maßeinheit	Messwert - 2-fache Messunsicherheit
Fleischteilstück Wildschwein	16.02.2009	Cs 137	661	Bq/kg(FM)	653
Fleischteilstück Wildschwein	01.04.2009	Cs 137	708	Bq/kg(FM)	683
Fleischteilstück Wildschwein	22.01.2009	Cs 137	723	Bq/kg(FM)	688
Fleischteilstück Wildschwein	20.02.2009	Cs 137	727	Bq/kg(FM)	694
Fleischteilstück Wildschwein	17.02.2009	Cs 137	824	Bq/kg(FM)	784
Fleischteilstück Wildschwein	20.01.2009	Cs 137	985	Bq/kg(FM)	940
Fleischteilstück Wildschwein	13.02.2009	Cs 137	1210	Bq/kg(FM)	1154

Anzahl: 7  
Anzahl signifikanter Überschreitungen

**Tabelle 5.11: Wildschweinproben mit Grenzwertüberschreitung NRW 2009**

Probenart	Radionuklid	Herkunftsland	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Fleischteilstück Hirsch auch tiefgefroren	Cs 137	Deutschland	1	0	2,1	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40		1	0	96	-		
Fleischteilstück Reh auch tiefgefroren	Cs 137	Deutschland	3	0	2,7	6,6	4,0	Bq/kg(FM)
	K 40		3	0	123	163	149	
Fleischteilstück Wildschwein auch tiefgefroren	Cs 137	Deutschland	103	1	5,6	1210	201	Bq/kg(FM)
	K 40		60	1	64	153	102	
Fleischteilstück Wildschwein auch tiefgefroren	Cs 137	Australien	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40		1	0	100	-	-	
Haarwild auch tiefgefroren	Cs 137	Deutschland	1	0	77	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40		1	0	93	-	-	
Tierkörper ganzer Fasan auch tiefgefroren	Cs 137	Deutschland	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40		1	0	106	-	-	


**Tabelle 5.12: Spezifische Cs-137 und K-40 Aktivitäten in Wildfleisch 2009**

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Anischampignon ( <i>Agaricus arvensis</i> )	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	150		-	
Birkenpilz ( <i>Leccinum scabrum</i> )	Cs 137	2	0	10	35	22	Bq/kg(FM)
	K 40	2	0	86	115	101	
Blauer Lacktrichterling ( <i>Laccaria amethystina</i> )	Cs 137	1	0	143		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	179		-	
Edel-Reizker ( <i>Lactarius deliciosus</i> )	Cs 137	3	1	5,5	8,9	7,2	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	68	102	83	
Fichtenreizker ( <i>Lactarius deterrimus</i> )	Cs 137	3	0	2,4	9,1	5,2	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	55	84	71	
Flaschenstäubling ( <i>Lycoperdon perlatum</i> )	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	87		-	
Frauentäubling ( <i>Russula cyanoxantha</i> )	Cs 137	1	0	7		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	110		-	
Goldröhrling ( <i>Suillus placidus</i> )	Cs 137	3	0	15	23	19	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	108	135	125	
Hallimasch ( <i>Armillariella mellea</i> )	Cs 137	9	1	0,86	21	10	Bq/kg(FM)
	K 40	9	0	35	370	131	
Krause Glucke ( <i>Sparassis crispa</i> )	Cs 137	1	0	4,7		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	121		-	
Kuhröhrling ( <i>Suillus bovinus</i> )	Cs 137	2	0	49	109	79	Bq/kg(FM)
	K 40	2	0	77	92	84	
Maronenpilz ( <i>Xerocomus badius</i> )	Cs 137	12	0	1,7	174	68	Bq/kg(FM)
	K 40	12	0	66	178	108	
Nebelgrauer Trichterling ( <i>Clitocybe nebularis</i> )	Cs 137	1	0	0,40		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	72		-	
Parasolpilz ( <i>Macrolepiota procera</i> )	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	207		-	
Pffierling ( <i>Cantharellus cibarius</i> )	Cs 137	3	0	1,6	27	10	Bq/kg(FM)
	K 40	3	0	228	470	330	
Ritterling violetter ( <i>Lepista nuda</i> )	Cs 137	1	0	0,82		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	87		-	
Rotbrauner Milchling ( <i>Lactarius rufus</i> )	Cs 137	1	0	2,3		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	125		-	
Rotfußröhrling ( <i>Xerocomus chrysenteron</i> )	Cs 137	2	0	22	36	29	Bq/kg(FM)
	K 40	2	0	111	138	125	
Schopftintling ( <i>Coprinus comatus</i> )	Cs 137	1	1	-	-	-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	86		-	
Semmel-Stoppelpilz ( <i>Hydnum repandum</i> )	Cs 137	1	0	37		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	179		-	
Steinpilz ( <i>Boletus edulis</i> b.ärens b.pinicola b.ästivalis)	Cs 137	13	0	1,6	62	24	Bq/kg(FM)
	K 40	13	0	50	116	81	
Wild-Blätterpilze	Cs 137	1	0	80		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	98		-	
Wildpilzmischungen	Cs 137	14	3	0,75	60	28	Bq/kg(FM)
	K 40	14	0	59	197	101	
Ziegenlippe ( <i>Xerocomus subtomentosus</i> )	Cs 137	1	0	3,5		-	Bq/kg(FM)
	K 40	1	0	181		-	

Anmerkung: NWG = Nachweisgrenze  
FM = Feuchtmasse

**Tabelle 5.13: Spezifische Cs-137 und K-40 Aktivitäten in Wildpilzen aus NRW 2009**

Bq / kg (FM)



**Abbildung 5.5 Spezifische Cs-137 Aktivität in Wildpilzen aus NRW 2009**  
Mittelwerte aus Einzelwerten bzw. Einzelwerte, Klammerangaben: Anzahl der Proben

## Trink- und Grundwasser, Oberirdische Gewässer

Die Radionuklidbestimmungen an Trinkwasser erstrecken sich auf 5 Wasserwerke, die ungeschützte Rohwässer (Oberflächenwasser, Uferfiltrat) und 5 Wasserwerke, die geschütztes Rohwasser (Grundwasser aus Tiefbrunnen) zu Trinkwasser verarbeiten. Diejenigen Wasserwerke, welche geschütztes Rohwasser verarbeiten, werden halbjährlich, diejenigen, welche ungeschütztes Rohwasser verarbeiten, werden vierteljährlich beprobt. Grundwasser wird aus 5 Brunnen entnommen und halbjährlich beprobt.

In allen Wasserproben lagen die ermittelten Werte für Cäsium-137, Strontium-90 und Alphastrahler (Tabelle 5.14) unterhalb bzw. im Bereich der geforderten Nachweisgrenzen (Tabelle 3.1) .

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Grundwasser (nicht zur Trinkwassergewinnung)	Cs 137	4	4	-	-	-	Bq/l
	K 40	4	0	0,10	0,24	0,14	
	Sr 90	2	2	-	-	-	
	H 3	2	2	-	-	-	
Rohwasser, geschützt, aus Grund- und Tiefenwasser	Cs 137	10	10	-	-	-	Bq/l
	K 40	10	8	0,13	0,15	0,14	
	Sr 90	2	0	0,012	0,040	0,026	
	H 3	2	2	-	-	-	
	Pu 238	4	4	-	-	-	
	Pu 239/240	2	2	-	-	-	
	U 234	4	0	0,0017	0,014	0,0055	
	U 235	4	4	-	-	-	
U 238	4	1	0,00061	0,0019	0,0013		
Rohwasser, ungeschützt, aus Oberflächenwasser	Am 241	1	1	-	-	-	Bq/l
	Cs 137	7	7	-	-	-	
	K 40	7	1	0,031	0,18	0,095	
	Sr 90	2	0	0,0020	0,0059	0,0039	
	H 3	2	2	-	-	-	
	Am 241	2	2	-	-	-	
	Pu 238	3	3	-	-	-	
	Pu 239/240	3	3	-	-	-	
	U 234	3	1	0,0052	0,011	0,0083	
	U 235	3	3	-	-	-	
U 238	3	1	0,0036	0,0095	0,0065		
Reinwasser aus ungeschützten Rohwasservorkommen	Cs 137	22	22	-	-	-	Bq/l
	K 40	22	8	0,028	0,24	0,093	
	Sr 90	4	0	0,0020	0,0066	0,0041	
	H 3	4	4	-	-	-	
	Am 241	3	3	-	-	-	
	Pu 238	6	6	-	-	-	
	Pu 239/240	6	6	-	-	-	
	U 234	6	2	0,0080	0,014	0,012	
	U 235	6	5	0,00069	-	-	
U 238	6	2	0,0050	0,0113	0,0086		
Reinwasser aus Mischroh-wasser	Cs 137	6	6	-	-	-	Bq/l
	K 40	6	4	0,15	0,46	0,31	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze

**Tabelle 5.14: Spezifische Aktivitäten verschiedener Radionuklide in Trink- und Grundwasser aus Wasserwerken und Brunnen NRW 2009**

Die Ermittlung der Radioaktivität in oberirdischen Gewässern erstreckt sich auf die Untersuchungen von Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben. Wasser aus sechs Fließgewässern wird kontinuierlich und aus sechs Talsperren diskontinuierlich beprobt. Schwebstoffe werden aus vier Fließgewässern und zwei Talsperren entnommen. Die Sedimentproben stammen aus vier Talsperren, zwei Bühnenfeldern, drei Hafeneinfahrten und drei Stauhaltungen. Die spezifischen Aktivitäten für Oberflächenwasser liegen alle unterhalb bzw. an der geforderten Nachweisgrenze von 0,01 Bq/l bzw. 10 Bq/l (für Tritium) (s. S. 12). Die spezifischen Aktivitäten an Cäsium-137 in Sedimenten und Schwebstoffen liegen im Bereich von einigen Bq/kg(TM) bis zu 186 Bq/kg(TM). Dabei sind die Mittelwerte für stehende Gewässer höher als diejenigen der Fließgewässer (Tabelle 5.15). Die Messwerte des Iod-131(I 131) sind auf Rückstände aus der Radiojodtherapie zurückzuführen.

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Wasser in Fließgewässern	Cs 137	20	20	-	-	-	Bq/l
	I 131	17	17	-	-	-	
	K 40	20	0	0,091	0,61	0,22	
	Sr 90	4	0	0,0010	0,0020	0,0015	
	H 3	20	20	-	-	-	
	Am 241	7	7	-	-	-	
	Pu 238	8	8	-	-	-	
	Pu 239/240	8	8	-	-	-	
	U 234	8	0	0,010	0,013	0,011	
	U 235	8	7	0,00044		-	
U 238	8	0	0,0064	0,0095	0,0082		
Schwebstoff in Fließgewässern	Cs 137	17	0	3,6	29	12	Bq/kg(TM)
	I 131	15	12	10	41	27	
	K 40	17	0	206	811	495	
Sediment in Fließgewässern	Am 241	6	6	-	-	-	Bq/kg(TM)
	Cs 137	25	0	0,67	31	7,7	
	I 131	24	19	0,71	3,6	2,0	
	K 40	25	0	150	696	523	
Wasser in stehenden Gewässern	Cs 137	28	28	-	-	-	Bq/l
	I 131	26	26	-	-	-	
	K 40	28	18	0,061	0,18	0,10	
	Sr 90	4	0	0,0020	0,060	0,021	
	H 3	28	28	-	-	-	
Schwebstoffe in stehenden Gewässern	Cs 137	8	4	12	22	16	Bq/kg(TM)
	I 131	4	4	-	-	-	
	K 40	8	0	660	920	751	
Sedimente in stehenden Gewässern	Am 241	1	1	-	-	-	Bq/kg(TM)
	Cs 137	24	0	5,4	186	37	
	I 131	23	22	1,2		-	
	K 40	24	0	181	850	518	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
 TM = Trockenmasse

**Tabelle 5.15: Spezifische Aktivitäten verschiedener Radionuklide in Oberflächenwasser, Schwebstoffen und Sedimenten aus Flüssen und Seen NRW 2009**

## Abfälle und Abwässer

In NRW werden im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes (StrVG) auch Abwässer und Klärschlamm aus zehn Kläranlagen, Sickerwasser und deponienahes Grundwasser von fünf Hausmülldeponien, Verbrennungsrückstände ( Filterasche, Schlacke, feste Rückstände und Waschwasser aus

Probenart	Radio-nuklid	Anzahl Werte Gesamt	Anzahl Werte < NWG	Kleinster Messwert	Größter Messwert	Mittelwert	Einheit
Abwasser aus Kläranlagenablauf	Cs 137	40	40	-	-	-	Bq/l
	I 131	40	30	0,044	4,7	0,70	
	K 40	40	36	0,55	4,9	1,8	
	Sr 90	4	2	0,064	0,083	0,073	
	Pu 238	4	4	-	-	-	
	Pu 239/240	4	4	-	-	-	
	U 234	4	3	0,011		-	
	U 235	4	4	-	-	-	
	U 238	4	2	0,0037	0,0095	0,0066	
Klärschlamm	Am 241	2	2	-	-	-	Bq/kg(TM)
	Cs 137	40	6	0,87	8,1	3,1	
	I 131	37	0	2,8	256	53	
	K 40	40	0	5,2	480	156	
	Sr 90	4	0	1,4	8,4	3,6	
	Pu 238	4	4	-	-	-	
	Pu 239/240	4	4	-	-	-	
	U 234	4	0	30	41	36	
	U 235	4	1	1,4	1,9	1,7	
U 238	4	0	23	36	29		
Filterstaub, Filterasche	Cs 137	6	0	12	43	23	Bq/kg(TM)
	I 131	6	6	-	-	-	
	K 40	6	0	760	2180	1538	
Kesselasche, Schlacke	Cs 137	6	1	0,50	1,2	0,90	Bq/kg(TM)
	I 131	6	6	-	-	-	
	K 40	6	0	122	228	188	
Feste Rückstände aus Rauchgaswäsche	Cs 137	6	4	4,0	4,2	4,1	Bq/kg(TM)
	I 131	6	2	4,9	18	12	
	K 40	6	0	3,6	227	76	
Flüssige Rückstände aus Rauchgaswäsche	Cs 137	4	2	0,13	0,13	0,13	Bq/l
	I 131	4	2	8,7	15	12	
	K 40	4	0	2,8	24	14	
Sicker- und Grundwasser	Cs 137	6	4	0,041	0,15	0,093	Bq/l
	I 131	6	6	-	-	-	
	K 40	6	0	7	55	23	
	H 3	6	1	5,4	176	77	
Kompost	Am 241	1	1	-	-	-	Bq/kg(TM)
	Cs 137	8	0	3,9	11	7,2	
	I 131	8	8	-	-	-	
	K 40	8	0	331	650	502	

Anmerkung: NWG = Erzielte Nachweisgrenze  
 TM = Trockenmasse

Tabelle 5.15: Spezifische Aktivitäten in Abfällen und Abwässern NRW 2009

der Rauchgasreinigung ) aus vier Müllverbrennungsanlagen und Kompost von einer Kompostierungsanlage untersucht. Nennenswerte spezifische Cäsium-137 Aktivitäten finden sich nur noch in den festen Endprodukten der jeweiligen Verarbeitungs- bzw. Beseitigungsanlagen. Dies sind Klärschlamm aus der Kläranlage, Filterasche, Schlacke und Rückstände aus der Rauchgaswäsche von Müllverbrennungsanlagen und der Kompost aus der Kompostierungsanlage. Die spezifischen Cäsium-137 Aktivitäten der wässrigen Produkte liegen unterhalb bzw. im Bereich der Nachweisgrenze ( Kläranlagen, Müllverbrennungsanlagen ). Auch in den Proben aus Kläranlagen sind Rückstände des Iod-131 aus der Radiojodtherapie nachweisbar (Tabelle 5.15).


## In-situ-Messungen

Der Einsatz von mobilen Messsystemen direkt vor Ort (lat.: in situ), erlaubt einen schnellen Überblick über den Gehalt an natürlichen und künstlichen radioaktiven Stoffen in und auf dem Boden. Die In-situ-Gammaspektrometrie ist ein in der Überwachung der Umweltradioaktivität routinemäßig eingesetztes Messverfahren. Es liefert innerhalb kürzester Zeit verfügbare Ergebnisse, die mittels Mobilfunk direkt vom Gelände aus, zusammen mit den exakten geographischen Positionsangaben, an die zuständige Bundesleitstelle übermittelt werden.



**Abbildung 5.6: In-situ Messung an einer ODL Station auf dem Gelände einer Schule**

An 173 Standorten in Nordrhein-Westfalen unterhält das Bundesamt für Strahlenschutz auf öffentlichen Wiesenflächen stationäre Messsonden ( ODL-Messnetz) , an denen kontinuierlich Messdaten der Gamma-Ortsdosisleistung abgerufen werden. 75 dieser Standorte wurden zur Ergänzung und Optimierung der ODL-Daten für zusätzliche In-situ-Messungen festgelegt. Jährlich wird zyklisch ein Drittel dieser Standorte vom In-situ-Messfahrzeug NRW angefahren.




**Abbildung 5.7: Übersichtskarte der 75 Messpunkte am Standort von ODL-Messsonden für die In-situ-Messungen in NRW**

Den wesentlichen Beitrag an künstlicher Radioaktivität in der Umwelt liefert das durch den Tschernobyl Reaktorunfall freigesetzte Cäsium-137. Während die Aktivitätskonzentration der natürlichen Radionuklide von den unterschiedlichen Gegebenheiten der geologischen Erdformationen an den Messorten bestimmt wird, hängt die örtliche Aktivitätsflächenbelegung durch die künstlichen Radionuklide stark von den meteorologischen Bedingungen ab.

Die folgenden Karten zeigen die aus den Aktivitätsmesswerten berechneten Dosisleistungen (Messwerte oberhalb der Nachweisgrenze) des Jahres 2009 in Nordrhein-Westfalen für das künstliche Radionuklid Cäsium-137 (Abbildung 5.8) und für das natürliche Radionuklid Kalium-40 (Abbildung 5.9), dessen Dosisleistung im Mittel um den Faktor 10 höher liegt.

Ebenfalls sind in den Karten die 173 ODL-Messstellen als Punkte dargestellt, deren Farbkodierungen den lokalen Jahresmittelwert der unspezifischen Ortsdosisleistung wiedergeben.



© Vermessungsverwaltungen der Länder und BKG 2006

## 24 Stunden – Mittelwert der Gamma-Ortsdosisleistung

Aktivitätskonzentration  
Messwert [ $\mu\text{Sv/h}$ ]  
0.001789



Aktivitätskonzentration  
Cs 137  
Skalierung: linear

- ODL  
Messwert [ $\mu\text{Sv/h}$ ]
- [2,71E-02 ; 3,76E-02] (0)
  - [3,76E-02 ; 4,81E-02] (0)
  - [4,81E-02 ; 5,86E-02] (5)
  - [5,86E-02 ; 6,91E-02] (28)
  - [6,91E-02 ; 7,96E-02] (37)
  - [7,96E-02 ; 9E-02] (33)
  - [9E-02 ; 1,01E-01] (45)
  - [1,01E-01 ; 1,11E-01] (15)
  - [1,11E-01 ; 1,22E-01] (4)
  - [1,22E-01 ; 1,32E-01] (0)
- (n): Häufigkeit der Werte

Deutschland


27.04.2010 02:00 (in ges. Zeit)

Datenquelle: BfS (ODL)  
§2 – Routinemessprogramm

- Landeshauptstadt
- ⬇ Regbezirke
- GEN Bundesländer
- Nordrhein-Westfalen (1)



Status: 1/1/1/Freigabe BMU  
Vorgangs-Id: 581050500 / 28.04.2010 11:13 (in ges. Zeit)



© Vermessungsverwaltungen der Länder und BKG 2006

## 24 Stunden – Mittelwert der Gamma-Ortsdosisleistung

Aktivitätskonzentration

Messwert [ $\mu\text{Sv/h}$ ]

0,01679



0,0

Aktivitätskonzentration

K 40

Skalierung: linear

ODL

Messwert [ $\mu\text{Sv/h}$ ]

- [2,71E-02 ; 3,76E-02) (0)
- [3,76E-02 ; 4,81E-02) (0)
- [4,81E-02 ; 5,86E-02) (5)
- [5,86E-02 ; 6,91E-02) (28)
- [6,91E-02 ; 7,96E-02) (37)
- [7,96E-02 ; 9E-02) (33)
- [9E-02 ; 1,01E-01) (45)
- [1,01E-01 ; 1,11E-01) (15)
- [1,11E-01 ; 1,22E-01) (4)
- [1,22E-01 ; 1,32E-01) (0)

(n): Häufigkeit der Werte

Deutschland

27.04.2010 02:00 (in ges. Zeit)

Datenquelle: BfS (ODL)

§2 – Routinemessprogramm



Landeshauptstadt



Regbezirke

GEN



Bundesländer



Bundesamt für Strahlenschutz  
(im Auftrag des BMU)

Status: 1/1/1/Freigabe BMU

Vorgangs-Id: 581050500 / 28.04.2010 11:13 (in ges. Zeit)

## 6. Glossar

### Aktivität

Zahl der je Sekunde sich in einem radioaktiven Stoff umwandelnden  $\rightarrow$ Atomkerne. Die Maßeinheit ist das Becquerel (Bq). Früher übliche Einheit war das Curie (Ci). Kurzzeichen: Ci,  $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$

### Aktivität, spezifische

Verhältnis der Aktivität eines Stoffes zur Masse des Stoffes, in dem das  $\rightarrow$ Radionuklid verteilt ist (Einheit Bq/kg).

### Aktivitätskonzentration

Verhältnis der Aktivität eines Stoffes zum Volumen des Stoffes (Einheit Bq/l)

### Aktivitätszufuhr

Die durch Mund oder Nase ( Ingestion bzw. Inhalation) oder durch die Haut in den Körper gelangte Menge radioaktiver Stoffe.

### Alphastrahlung

Strahlung radioaktiver Stoffe, die aus  $\rightarrow$ Alphateilchen besteht. Die Energie der Alphateilchen ist spezifisch für den Atomkern von dem sie stammen. Alphastrahlung ist die am wenigsten durchdringende Strahlung der vier Strahlungsarten (Alpha- Beta-, Gamma- und Neutronenstrahlung). Sie wird schon durch ein Blatt Papier absorbiert und ist nur dann gefährlich, wenn die Alphastrahler eingeatmet oder mit der Nahrung aufgenommen werden oder in Wunden gelangen.

### Alphateilchen

Bei bestimmten radioaktiven Zerfällen ausgesandtes, positiv geladenes Teilchen. Es besteht aus Heliumkern (zwei  $\rightarrow$ Neutronen und zwei  $\rightarrow$ Protonen).

### Alphazerfall

Radioaktive Umwandlung, bei der ein  $\rightarrow$ Alphateilchen emittiert wird. Beim Alphazerfall nimmt die Ordnungszahl um zwei Einheiten und die Massenzahl um vier Einheiten ab.

### Angeregter Zustand

Zustand eines  $\rightarrow$ Atoms oder  $\rightarrow$ Atomkerns mit einer höheren Energie, als im Grundzustand. Die Überschussenergie wird im allgemeinen als  $\rightarrow$ Gammaquant abgegeben.

### Äquivalentdosis

Produkt aus der  $\rightarrow$ Energiedosis (absorbierte Dosis, Einheit: Gray, Gy=Joule/kg) im Standard-Weichteilgewebe und einem  $\rightarrow$ Qualitätsfaktor. Bei Kombination mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die Äquivalentdosis die Summe ihrer ermittelten Einzelbeiträge. Einheit ist das Sievert (Sv) früher das Rem  $1 \text{ Sv} = 100 \text{ rem}$

### Atom

Das kleinste Teilchen eines Elementes, das auf chemischem Wege nicht weiter teilbar ist. Es besteht aus einem  $\rightarrow$ Atomkern und einer Hülle von  $\rightarrow$ Elektronen. Der Durchmesser beträgt ungefähr ein hundertmillionstel Zentimeter ( $10^{-8} \text{ cm}$ ).

### Atomgewicht

Relativzahl für die Masse eines  $\rightarrow$ Atoms. Die Grundlage der Einheit ist das Kohlenstoffatom, dessen Kern aus 6  $\rightarrow$ Protonen und 6  $\rightarrow$ Neutronen besteht. Ihm wurde das Atomgewicht 12 zugeteilt. Somit ist die Atomgewichtseinheit 1/12 des Gewichtes des Kohlenstoff 12.

### Atomkern

Der positiv geladene Kern eines  $\rightarrow$ Atoms. Sein Durchmesser beträgt einige  $10^{-13} \text{ cm}$ , das ist rund 1/100.000 des Atomdurchmessers. Er enthält fast die gesamte Masse des Atoms. Er besteht aus  $\rightarrow$ Protonen und  $\rightarrow$ Neutronen. Die Anzahl der Protonen bestimmt die Kernladungs- oder Ordnungszahl Z, die Summe der Protonen und Neutronen ergibt die Massenzahl M des Kernes.

### Becquerel

Einheit der  $\rightarrow$ Aktivität eines radioaktiven Stoffes

### **Beschleuniger**

Gerät zum Beschleunigen von geladenen Elementarteilchen (z.B. →Elektronen, →Protonen, →Ionen). Bei Kollisionen dieser Teilchen mit Atomkernen bei hoher Bewegungsenergie können Kernreaktionen ablaufen, bei denen als Produkt radioaktive Stoffe entstehen.

### **Betastrahlung**

Strahlung von radioaktiven Stoffen, die aus →Elektronen besteht. Die Energie ist kontinuierlich bis zu einer Maximalenergie verteilt. Betastrahlen werden bereits durch geringe Schichtdicken (z.B. 2 cm Kunststoff oder 1 cm Aluminium) absorbiert. Beispiele für reine Betastrahler sind Strontium-90 (→Strontium-90-Bestimmung) und Tritium (→H<sup>3</sup>-Bestimmung)

### **Betateilchen**

→Elektron (negative Ladung) oder dessen Antiteilchen →Positron (positive Ladung), das von einem Atomkern oder Elementarteilchen beim Betazerfall ausgesandt wird.

### **Betazerfall**

Radioaktive Umwandlung unter Emission eines →Betateilchens

### **Bodenstrahlung**

Strahlung, die von radioaktiven Ablagerungen im Boden ausgeht (→Strahlung, terrestrisch)

### **Bq**

Kurzzeichen für →Becquerel als Einheit für die Aktivität (1Bq = 1 Zerfall pro Sekunde)

### **Ci**

Kurzzeichen für →Curie als alte Einheit für die →Aktivität (1 Ci =

### **Dekontamination**

Beseitigung oder Verminderung einer →Kontamination

### **Dosimetrie**

Messverfahren zur Bestimmung der durch ionisierende Strahlung in Materie erzeugten →Ionen-, →Energie- oder →Äquivalentdosis

### **Dosis**

Äquivalentdosis, →Dosis, effektive, →Körperdosis, →Organdosis, →Ortsdosis, →Personendosis

### **Dosis, effektive**

Summe der gewichteten →Organdosen in den Geweben oder Organen des Körpers. Wichtungsfaktoren sind die Strahlenempfindlichkeit sowie die Speicherfähigkeit des Organs für den radioaktiven Stoff.

### **Dosis, genetisch signifikante**

Die genetisch signifikante Dosis ist definiert als die Summe der mit einem genetischen Wichtungsfaktor multiplizierten Werte der Keimdrüsendosen aller Angehörigen einer Bevölkerungsgruppe, dividiert durch deren Anzahl. Dabei ist im genetischen Wichtungsfaktor die mittlere Kindererwartung der strahlenexponierten Personen in Abhängigkeit vom Alter berücksichtigt.

### **Dosis-Wirkungs-Beziehung**

Beziehung zwischen der →Energie- oder →Äquivalentdosis und der daraus resultierenden →Strahlenwirkung

### **Dosisfaktor**

Wirksamkeitsfaktor eines radioaktiven Stoffes zur Ermittlung der →Strahlenexposition durch inkorporierte radioaktive Stoffe. Der Dosiskoeffizient ist abhängig vom →Radionuklid (effektive Halbwertszeit, Strahlungsart, Zielorgan), von der Inkorporationsart (Inhalation/ Ingestion), von der chemischen Verbindung des Radionuklids (löslich/unlöslich), sowie vom Alter der Person.

### **Dosisgrenzwert**

Gesetzlich vorgeschriebene Obergrenze einer Dosis für die Exposition beruflich oder nicht beruflich strahlenexponierter Personen. Für die Bevölkerung sind folgende Grenzwerte in der Strahlenschutzverordnung festgelegt:

effektive Dosis; Keimdrüsen, Gebärmutter, rotes Knochenmark 0,3 mSv/Jahr

alle anderen Organe 0,9 mSv/Jahr

Knochenoberfläche, Haut 1,8 mSv/Jahr

### **Dosisleistung**

Die Dosisleistung ist der Quotient aus der Dosis und der Zeit

### **Elektron**

Negativ geladenes Elementarteilchen mit einer Ruhemasse von  $9,1094 \cdot 10^{-31}$  kg (entspricht einer Ruheenergie von 511 keV), das ist 1/1836 der Protonenmasse. Elektronen umgeben den positiv geladenen →Atomkern und bestimmen das chemische Verhalten des Atoms.

### **Elektronvolt**

In der Atom- und Kernphysik gebräuchliche Einheit der Energie. Ein Elektronvolt (eV) ist die von einem Elektron oder sonstigen einfach geladenen Teilchen gewonnene Bewegungsenergie beim Durchlaufen einer Spannungsdifferenz von 1 Volt im Vakuum.

### **Element**

Chemischer Grundstoff, der sich auf chemischem Wege nicht mehr in einfachere Substanzen umwandeln lässt.

### **Elementarladung**

Kleinste elektrische Ladungseinheit ( $1,6021 \cdot 10^{-19}$  Coulomb). Die elektrische Ladung tritt nur in ganzzahligen Vielfachen dieser Einheit auf. Ein →Elektron besitzt eine negative, ein →Proton eine positive Elementarladung.

### **Elementarteilchen**

Teilchen, die sich derzeit nicht als zusammengesetzt erkennen lassen.

### **Energiedosis**

Gesamte absorbierte Strahlungsenergie in der Masseneinheit. Die Einheit der Energiedosis ist Gray (Gy)  $1 \text{ Gy} = 1 \text{ Joule durch Kilogramm (J/kg)}$

### **eV**

Kurzbezeichnung für →Elektronvolt

### **Expositionspfad**

Weg der radioaktiven Stoffe von der Ableitung aus einer Anlage oder Einrichtung über einen Ausbreitungs- oder Transportvorgang bis zu einer →Strahlenexposition des Menschen.

### **Folgedosis, effektive**

→Äquivalentdosis, die ein Organ oder Gewebe durch Inkorporation eines oder mehrerer Radionuklide während des folgenden Bezugszeitraumes erhält. (50-Jahre-Folgedosis = Dosis während eines Zeitraumes von 50 Jahren nach der Inkorporation)

### **Gammaquant**

Energiequant kurzwelliger elektromagnetischer Strahlung, welches vom →Atomkern beim Übergang von einem höher in einen niedriger angeregten Energiezustand ausgesandt wird. Die Energien von Gammaquanten liegen gewöhnlich zwischen 0,01 und 10 MeV.

### **Gammaskpektrum**

Energieverteilung der →Gammaquanten eines →Radionuklids oder einer Mischung von Radionukliden, welches zu deren Identifizierung und Quantifizierung gemessen wird

### **Gammastrahlung**

Hochenergetische, kurzwellige elektromagnetische Strahlung, die aus  $\rightarrow$ Gammaquanten besteht. Gammastrahlen sind sehr durchdringend und lassen sich am besten durch Materialien hoher Dichte (z.B. Blei) schwächen.

### **Ganzkörperdosis**

Mittelwert der  $\rightarrow$ Äquivalentdosis über Kopf, Rumpf, Oberarme und Oberschenkel als Folge einer als homogen angesehenen Bestrahlung des ganzen Körpers.

### **Gray**

Einheit der Energiedosis 1 Gray (Gy) = 1 Joule/Kilogramm;(frühere Einheit:Rad (rd); 1Gy = 100 rd)

### **Halbwertszeit, physikalische**

Zeit, in der die Hälfte der Kerne eines  $\rightarrow$ Radionuklids zerfällt.

### **Halbwertszeit, biologische**

Zeit, in der ein biologisches System, beispielsweise ein Mensch oder Tier, auf natürlichem Wege die Hälfte der aufgenommenen Menge eines bestimmten Stoffes aus dem Körper oder einem speziellen Organ ausscheidet.

### **Halbwertszeit, effektive**

Zeit, in der in einem biologischen System die Menge eines Radionuklids im Zusammenwirken von physikalischer und biologischer Halbwertszeit auf die Hälfte abnimmt

$$T_{\text{eff}} = (T_{\text{phys}} \cdot T_{\text{biol}}) / (T_{\text{phys}} + T_{\text{biol}})$$

### **Ingestion**

Aufnahme von radioaktiven Stoffen durch Nahrungsmittel und Trinkwasser

### **Inhalation**

Aufnahme von radioaktiven Stoffen durch Einatmen

### **Inkorporation**

Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Organismus durch Inhalation und Ingestion

### **Ionendosis**

Gesamte in Luft pro Masseneinheit durch  $\rightarrow$ ionisierende Strahlung erzeugte elektrische Ladung. Die Einheit der Ionendosis ist Coulomb pro Kilogramm (C/kg). Bis Ende 1985 wurde die Einheit Röntgen (Kurzzeichen: R) verwendet. 1 Röntgen =  $2,58 \cdot 10^{-4}$  C/kg.

### **Ionendosisleistung**

Die in einer bestimmten Zeit abgegebene  $\rightarrow$ Ionendosis dividiert durch die Zeitdauer. Die Einheit ist Ampere pro Kilogramm (A/kg), wobei A = C/s. Bis Ende 1985 wurde die Einheit Röntgen/Stunde (R/h) verwendet. 1 R/h =  $7,17 \cdot 10^{-8}$  A/kg.

### **Ionisation**

Aufnahme oder Abgabe von  $\rightarrow$ Elektronen durch  $\rightarrow$ Atome oder Moleküle, die dadurch in  $\rightarrow$ Ionen umgewandelt werden. Hohe Temperaturen, elektrische Entladungen und energiereiche Strahlung können zur Ionisation führen.

### **Ion**

Elektrisch geladenes atomares oder molekulares Teilchen, das aus einem neutralen  $\rightarrow$ Atom oder Molekül durch Abspaltung oder Anlagerung von  $\rightarrow$ Elektronen oder durch elektrolytische Dissoziation von Molekülen in Lösungen entstehen kann.

### **Isotope**

$\rightarrow$ Atome derselben Kernladungszahl (d.h. desselben chemischen  $\rightarrow$ Elementes), jedoch unterschiedlicher Neutronenzahl.

### **Körperdosis**

Sammelbegriff für →Organdosis und effektive →Dosis. Die Körperdosis für einen Bezugszeitraum (z.B. Kalenderjahr, Monat) ist die Summe aus der durch äußere Strahlenexposition während dieses Bezugszeitraums erhaltenen Dosis und der →Folgedosis, durch eine →Aktivitätszufuhr während dieses Bezugszeitraums.

**Kontamination** Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen, bei der eine Weiterverbreitung der radioaktiven Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann.

**Kontrollbereich** Bereich, in dem Personen infolge des Umgangs mit radioaktiven Stoffen oder des Betriebs von Anlagen zur Erzeugung ionisierender →Strahlen durch äußere oder innere →Strahlenexposition im Kalenderjahr eine effektive →Dosis von mehr als 6 mSv oder höhere →Organdosen für die Augenlinse von mehr als 45 mSv oder für die Haut, Hände, Unterarme, Füße, Unterschenkel, von mehr als 150 mSv erhalten können.

### **Lineare Energieübertragung**

Energieabgabe eines ionisierenden Teilchens an die durchstrahlte Materie. Der lineare Energieübertrag wird in keV/μm (→eV) angegeben (→Qualitätsfaktor).

### **Neutron**

Kernbaustein bestehend aus zwei "down"- und einem "up"-→Quarks

### **Nukleon**

Gemeinsame Bezeichnung für →Proton und →Neutron.

### **Nukleonenzahl**

Anzahl der →Protonen und →Neutronen (→Nukleonen) in einem →Atomkern. Die Nukleonenzahl des  $^{238}\text{U}$  ist 238 ( 92 Protonen und 146 Neutronen).

### **Nuklid**

Eine durch seine Protonenzahl, Neutronenzahl und seinen Energiezustand charakterisierte Atomart. Zur Zeit sind etwa 2500 verschiedene Nuklide bekannt, die sich auf die 111 zur Zeit bekannten Elemente verteilen. Davon sind über 2200 Nuklide radioaktiv (→Radionuklide).

### **Organdosis**

→Äquivalentdosis in einem Organ, Gewebe oder Körperteil . Bei Kombination mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die gesamte Organdosis die Summe der Einzelbeiträge durch äußere oder innere →Strahlenexposition.

### **Ortsdosis**

→Äquivalentdosis, gemessen an einem bestimmten Ort.

### **Ortsdosisleistung**

In einer bestimmten Zeit erzeugte →Ortsdosis, dividiert durch die Zeitdauer.

### **Paarbildung**

Wechselwirkung von energiereicher elektromagnetischer Strahlung mit Materie. Ist die Energie der Strahlung größer als 1,02 MeV, besteht die Möglichkeit zur Erzeugung eines →Elektron→Positron-Paares (Materialisation von Energie).

### **Personendosis**

→Äquivalentdosis, gemessen an einer für die →Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche.

### **Photo-Effekt**

Wechselwirkung von Röntgen- und →Gammastrahlung mit Materie. Das Röntgen- oder →Gammaquant überträgt seine Energie an ein Hüllelektron des →Atoms. Das →Elektron erhält hierbei Bewegungsenergie, die gleich der Energie des Quants, vermindert um die Bindungsenergie des Elektrons ist.

**Positron**

Positiv geladenes Antiteilchen des →Elektrons

**Proton**

Kernbaustein bestehend aus zwei "up"- und einem "down"-→Quarks

**Photon**

Energiequant der elektromagnetischen Strahlung. Die Ruhemasse des Photons ist Null. Es hat keine elektrische Ladung.

**Qualitätsfaktor**

Wichtungsfaktor zur Ermittlung der →Äquivalentdosis, der die Einflüsse Strahlungsart und -energie (Strahlungsqualität) auf die biologische Wirksamkeit der Strahlung (→Strahlenwirkung) berücksichtigt. Für →Photonen und →Elektronen aller Energien hat der Qualitätsfaktor den Wert  $Q = 1$ .

**Quarks**

Elementarteilchen, die durch Gluonen verbunden, Bausteine von Neutron und Proton sind

**Radionuklide, kurzlebige**

Radioaktive →Atomkerne mit einer Halbwertszeit bis zu 100 Tagen

**Radionuklide, langlebige**

Radioaktive →Atomkerne mit einer Halbwertszeit von mehr als 100 Tagen

**Radioaktivität**

Doppeldeutig: Potenzial instabiler Atomkerne, sich unter Aussendung von →ionisierender Strahlung in stabilere umzuwandeln oder Gehalt an radioaktiven Stoffen

**Radiotoxizität**

Maß für die Gesundheitsschädlichkeit eines →Radionuklids

**Sievert**

Einheit für die →Äquivalentdosis  $1\text{Sv} = 100\text{rem}$

**Sperrbereich**

Bereich des →Kontrollbereichs, in dem die →Ortsdosisleistung höher als 3 mSv pro Stunde sein kann.

**Stoffe, offene radioaktive**

Alle radioaktiven Stoffe mit Ausnahme der umschlossenen radioaktiven Stoffe.

**Stoffe, umschlossene radioaktive**

Radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten, festen, inaktiven Hülle umschlossen oder in festen inaktiven Stoffen ständig so eingebettet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung muss mindestens 0,2 cm betragen.

**Strahlen, ionisierende**

Photonen- oder Teilchenstrahlen, die in der Lage sind, direkt oder indirekt die Bildung von →Ionen zu bewirken

**Strahlenexposition**

Einwirkung ionisierender →Strahlung auf den menschlichen Körper. Ganzkörperexposition ist die Einwirkung ionisierender Strahlung auf den ganzen Körper, Teilkörperexposition ist die Einwirkung ionisierender Strahlung auf einzelne Organe, Gewebe oder Körperteile. Äußere Strahlenexposition ist die Einwirkung durch Strahlungsquellen außerhalb des Körpers, innere Strahlenexposition ist die Einwirkung durch Strahlungsquellen innerhalb des Körpers.

### **Strahlenexposition, natürliche**

Einwirkung ionisierender →Strahlung bestehend aus natürlicher kosmischer und terrestrischer Strahlung. In der Bundesrepublik Deutschland beträgt die natürliche Strahlenexposition für die meisten Einwohner zwischen 1,5-4 mSv pro Jahr. Der Durchschnittswert beträgt 2,4 mSv.

### **Strahlenexposition, medizinische**

Exposition einer Person im Rahmen ihrer medizinischen Untersuchung oder Behandlung in der Heilkunde oder Zahnheilkunde (Patient), oder Exposition einer Person, an der mit ihrer Einwilligung radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung in der medizinischen Forschung angewendet werden (Proband).

In der Bundesrepublik Deutschland beträgt die genetisch signifikante →Strahlendosis durch die Röntgendiagnostik pro Einwohner im Durchschnitt ( regional mit großen Unterschieden) 0,5 mSv pro Jahr, wobei die Schwankungsbreite dieses Wertes zu etwa 50% abgeschätzt wird. Daraus ergibt sich rechnerisch aus den →Organdosen eine effektive →Äquivalentdosis von 1 mSv pro Einwohner.

Die therapeutische Strahlenanwendung und die Radionuklidanwendung in der Nuklearmedizin liefern dagegen nur kleine Dosisbeiträge in Bezug auf die Gesamtbevölkerung.

### **Strahlenschutzbereich**

→Überwachungsbereich, →Kontrollbereich und →Sperrbereich als Teil des Kontrollbereichs

### **Strahlenwirkungen, stochastische**

"Stochastische" Wirkungen beruhen auf dem Zufallsprinzip. Es sind solche, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten, jedoch nicht ihr Schweregrad als eine Funktion der →Dosis betrachtet wird.

Für sie existiert im Gegensatz zu "nicht stochastischen" Wirkungen kein Schwellenwert. Bei "nicht stochastischen" Wirkungen variiert der Schweregrad der Wirkungen mit der Dosis, und es kann daher ein Schwellenwert bestehen.

In dem für Strahlenschutz zwecke relevanten Dosisbereich werden vererbare Wirkungen als stochastisch angesehen. Auch einige somatische Wirkungen sind stochastischer Natur. Hierbei wird die Krebsentstehung als das wichtigste somatische Strahlenrisiko bei niedrigen Dosen angesehen.

### **Strahlenwirkungen, genetische**

biologische Strahlenwirkungen, die sich auf die Nachkommen der exponierten Person in der ersten oder späteren Generationen auswirken

### **Strahlenwirkungen, somatische**

biologische Strahlenwirkungen, die sich auf die exponierte Person, jedoch nicht auf ihre Nachkommen auswirken.

### **Strahlung, ionisierende**

→Strahlen, ionisierende

### **Strahlung, kosmische**

Natürliche Strahlung, die direkt oder indirekt aus Quellen außerhalb der Erde herrührt. Sie ist abhängig von der Höhe über dem Meer ( in Meereshöhe ca. 0,3 mSv pro Jahr , auf der Zugspitze ca. 1,1 mSv pro Jahr )

### **Strahlung, terrestrische**

Natürliche Strahlung, die direkt oder indirekt aus Quellen innerhalb der Erde herrührt. Sie ist abhängig von der spezifischen Aktivität im Boden (0,2 - 2 mSv pro Jahr). Der Mittelwert der Bundesrepublik beträgt 0,7mSv pro Jahr.

### **Tritium**

→Radionuklid des Wasserstoffs bestehend aus einem →Proton und zwei →Neutronen

### **Überwachungsbereich**

Überwachungsbereiche sind nicht zum →Kontrollbereich gehörende betriebliche Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive →Dosis von mehr als 1 Millisievert oder höhere

→Organdosen als 15 Millisievert für die Augenlinse oder 50 Millisievert für die Haut, die Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können.

**Umgang mit radioaktiven Stoffen**

Gewinnung, Erzeugung, Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung, sonstige Verwendung und Beseitigung von radioaktiven Stoffen im Sinne des § 2 des Atomgesetzes sowie der Betrieb von Bestrahlungsvorrichtungen; als Umgang gilt auch die Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung von radioaktiven Bodenschätzen im Sinne des Bundesberggesetzes.

**Unfall, radiologischer**

Ereignisablauf, der für eine oder mehrere Personen eine effektive →Dosis von mehr als 50 Millisievert (→Sievert) zur Folge haben kann.

**Zerfall**

Die spontane Umwandlung eines →Nuklids in ein anderes oder in einen anderen Energiezustand des selben Nuklids

**Zerfallsenergie**

Die bei einem →Zerfall freigesetzte Energie

**Zerfallskonstante**

Die Zerfallskonstante  $\lambda$  eines radioaktiven →Zerfalls ist gleich dem Reziprokwert der mittleren Lebensdauer  $t$ . Zwischen der Zerfallskonstanten  $\lambda$ , der mittleren Lebensdauer  $t$  und der →Halbwertszeit  $T$  bestehen folgende Beziehungen  $\lambda = 1/t = \ln 2 / T$